



AMOXICILINA-ACIDO CLAVULANICO 500 mg - 125 mg TABLETAS RECUBIERTAS

Composición: Cada tableta recubierta contiene: Amoxicilina como (Amoxicilina trihidrato) 500 mg, Ácido Clavulánico como (clavulanato potásico) 125 mg, Excipientes c.s.

Indicaciones: Tratamiento de infecciones causadas por gérmenes productores de betalactamasa sensibles a la combinación de amoxicilina y ácido clavulánico.

Vía de Administración: Oral.

Posología: (A criterio del médico tratante): Las dosis se expresan en términos de Amoxicilina, se puede ingerir con agua. Adultos y niños con peso mayor o igual a 40 kg: 250 mg / 500 mg cada 8 horas.

Advertencias: Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que el médico lo indique. El uso prolongado o indiscriminado de este producto puede ocasionar la aparición de gérmenes resistentes. Suspenda el tratamiento e informe inmediatamente al médico si se presentan síntomas de alergia o diarrea intensa y persistente con náuseas, dolor abdominal y fiebre. No exceda la dosis prescrita ni interrumpa el tratamiento antes del tiempo previsto, aunque hayan desaparecido los síntomas de la infección. Antes de administrar este producto, lea el prospecto interno. Manténgase este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugar fresco, seco, protegido de la luz y a temperatura inferior a 30° C.