



CAPTOPRIL 25mg TABLETAS

Composición: Cada tableta contiene: Captopril 25,00 mg, Lactosa 25,00 mg, Almidón de Maíz 22,50 mg, Excipientes c.s.

Indicaciones: Tratamiento de la hipertensión arterial. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Prevención de la dilatación y disfunción ventricular progresiva en pacientes post-infarto. Disminución de la progresión de la nefropatía diabética con o sin hipertensión arterial.

Vía de Administración: Oral.

Posología: Hipertensión arterial: Dosis inicial de 25 mg cada 8 a 12 horas al día, seguida por incrementos graduales cada 1-2 semanas (según respuesta clínica) hasta 50 mg cada 8 a 12 horas al día. Insuficiencia cardíaca congestiva: Dosis inicial de 25 mg cada 8 a 12 horas al día, seguida por incrementos graduales (según respuesta clínica) hasta 50 mg cada 8 horas. De ser necesarios incrementos adicionales, deben realizarse a intervalos de al menos 2 semanas hasta obtener la respuesta deseada, lo que se logra usualmente con dosis de 50 - 100 mg cada 8 horas al día. Dosis máxima diaria: 450 mg/día. Posterior a infarto de miocardio: 25 - 50 mg cada 8 a 12 horas al día. Nefropatía diabética: 25 - 50 mg cada 8 a 12 horas al día. Dosis máxima diaria: 450 mg/día.

Advertencias:

Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspenda la lactancia materna mientras dure el tratamiento.



Si con el uso de este producto se presenta alguna reacción o síntoma inusual, suspenda el tratamiento y notifique de inmediato al médico. Este producto no debe administrarse a pacientes con intolerancia a la lactosa o galactosa. Antes de administrar este producto, lea el prospecto interno. No exceda la dosis prescrita. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugar fresco, seco, protegido de la luz y a temperatura inferior a 30° C.