



CARVEDILOL 6,25 mg TABLETAS RECUBIERTAS

Composición: Cada tableta recubierta contiene: Carvedilol 6,25 mg, Lactosa 77,40 mg, Almidón de Maíz 34,20 mg, Excipientes c.s.

Indicaciones: Tratamiento coadyuvante de la insuficiencia cardíaca congestiva grado II y III. Tratamiento de la hipertensión arterial leve a moderada. Tratamiento a largo plazo de la angina de pecho estable e inestable.

Vía de Administración: Oral.

Posología: Tratamiento coadyuvante de la insuficiencia cardíaca congestiva grado II y III: Dosis inicial: 3,125 mg cada 12 horas. Dosis de mantenimiento: 6,25 mg -12,5 mg cada 12 horas. Tratamiento de la hipertensión arterial leve a moderada. Dosis: 25 -50 mg/día. Tratamiento a largo plazo de la angina de pecho estable e inestable. Estable: 25 mg cada 12 horas. Inestable: Dosis inicial: 3,125 -12,5 cada 12 horas. Dosis máxima: 25 mg cada 12 horas. Individualizar dosis según requerimientos.

Advertencias: Producto de uso delicado que solo debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase la lactancia mientras dure el tratamiento. El uso de este producto por tiempo prolongado puede causar dependencia. Este producto puede causar somnolencia. Durante su administración evítense actividades que impliquen coordinación y estados de alerta mental, como conducir vehículos u operar maquinarias. Durante el tratamiento no ingiera bebidas alcohólicas. No exceda la dosis prescrita, ni suspenda el tratamiento sin el consentimiento del médico. Este producto no debe administrarse a pacientes con intolerancia a la lactosa o galactosa. Antes de administrar este producto, leer el prospecto interno.