



CARVEDILOL 25 mg TABLETAS RECUBIERTAS

Composición: Cada tableta recubierta contiene: Carvedilol 25,00 mg, Lactosa 106,40 mg, Almidón de Maíz 52,80 mg, Excipientes c.s.

Indicaciones: Tratamiento coadyuvante de la insuficiencia cardíaca congestiva grado II y III. Tratamiento de la hipertensión arterial leve a moderada. Tratamiento a largo plazo de la angina de pecho estable e inestable.

Vía de Administración: Oral.

Posología: (Rango posológico): Tratamiento coadyuvante de la insuficiencia cardíaca congestiva grado II y III: Dosis inicial: 3,125 mg cada 12 horas. Dosis de mantenimiento: 6,25 mg -12,5 mg cada 12 horas. Tratamiento de la hipertensión arterial leve a moderada. Dosis: 25 -50 mg/día. Tratamiento a largo plazo de la angina de pecho estable e inestable. Estable: 25 mg cada 12 horas. Inestable: Dosis inicial: 3,125 -12,5 mg cada 12 horas. Dosis máxima: 25 mg cada 12 horas. Individualizar dosis según requerimientos.

Advertencias: Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia a menos que el médico lo indique. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase la lactancia mientras dure el tratamiento. Este producto no debe administrarse en pacientes con intolerancia a la lactosa o galactosa. Antes de administrar este producto, lea el prospecto interno. No exceda la dosis prescrita. Manténgase este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugar fresco, seco, protegido de la luz a temperatura inferior a 30° C.