



CIPROFLOXACINA 500 mg TABLETAS RECUBIERTAS

Composición: Cada tableta recubierta contiene: Ciprofloxacin Clorhidrato (equivalente a Ciprofloxacin) 500 mg, Lactosa 157,73 mg, Excipientes c.s.

Indicaciones: Tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles a ciprofloxacin. Tratamiento de infecciones no complicadas del tracto respiratorio alto. Tratamiento de infecciones no complicadas del tracto urinario bajo. Tratamiento de la gonorrea. Tratamiento de la diarrea del viajero. Prevención y tratamiento de infecciones postexposición vía inhalatoria a *Bacillus anthracis* (ántrax)

Vía de Administración: Oral.

Posología: Adultos, Infecciones causadas por gérmenes sensibles a ciprofloxacin: 250 - 750 mg cada 12 horas. Infecciones no complicadas del tracto respiratorio alto: 500 mg cada 12 horas por 10 días. Infecciones no complicadas del tracto urinario bajo: 250 mg cada 12 horas por 3 días. Gonorrea: 250 mg (dosis única) Diarrea del viajero: 500 mg cada 12 horas por 1-3 días. Prevención y tratamiento de infecciones, postexposición a *B. anthracis*: 500 mg cada 12 horas por 60 días. Niños y adolescentes (<18 años) Infecciones complicadas de vías urinarias causadas por *E. coli* (niños de 1 - 17 años): 10 - 20 mg/kg (máximo 750 mg/dosis) cada 12 horas por 10 - 21 días. Infecciones por *P. aeruginosa* en pacientes con fibrosis quística (niños de 5 - 17 años): 20 mg/kg (máximo 750 mg/dosis) cada 12 horas por 10 - 14 días. Prevención y tratamiento de infecciones, postexposición a *B. anthracis*: 15 mg/kg (máximo 500 mg/dosis) cada 12 horas por 60 días.

Advertencias: Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, a menos que el médico lo indique. De ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspenda la lactancia materna mientras dure el



tratamiento. Durante su uso, evite en lo posible la exposición al sol por el riesgo de foto sensibilización. El uso prolongado o indiscriminado de este producto puede ocasionar la aparición de gérmenes resistentes. Este producto no debe administrarse en pacientes con intolerancia a la lactosa o galactosa. No exceda la dosis prescrita ni interrumpa el tratamiento antes del tiempo previsto, aunque hayan desaparecido los síntomas de la infección. Antes de administrar este producto, lea el prospecto interno. Manténgase este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugar fresco, seco, protegido de la luz y a temperatura inferior a 30° C.