



CLOTRIMAZOL 1 % CREMA

Composición: Cada 100 g de crema contiene: Clotrimazol 1,00 g, Alcohol Cetoestearílico y Bencílico, Decyl Oleato, Polisorbato 80 y 60, Propilenglicol, EDTA Disódico, Metil y Propilparabeno, Agua Purificada c.s.

Indicaciones: Tratamiento de las micosis superficiales de la piel. Dermatitis asociada al uso del pañal (pañalitis) causada por *Cándida albicans*.

Vía de Administración: Uso tópico dermatológico.

Posología: (Dosis recomendada): Adultos y niños: Una (1) aplicación en la zona afectada 2 veces al día, durante 15 días. Una vez desaparecidas las lesiones, continuar el tratamiento por 10 días más para evitar recaídas. Dermatitis asociada al uso del pañal (pañalitis): Niños: 2 - 3 aplicaciones al día.

Advertencias: Si está embarazada o en período de lactancia, consulte al médico antes de usar este producto. Si los síntomas persisten y no se observa mejoría después de 2 semanas con el uso de este medicamento, suspéndalo y consulte al médico. Si se presenta ardor, irritación, inflamación, enrojecimiento o picazón en el sitio de aplicación, o si la condición se agrava, suspenda el uso y consulte al médico. Evite el contacto con los ojos. No exceda la dosis recomendada ni interrumpa el tratamiento antes del tiempo previsto, aunque hayan desaparecido los síntomas de la infección.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugar fresco, a temperatura inferior a 30° C.