



## DICLOFENACO POTASICO 50 mg TABLETAS RECUBIERTAS

**Composición:** Cada tableta recubierta contiene: Diclofenaco Potásico 50,0 mg, Lactosa 89,0 mg, Excipientes c.s.

**Indicaciones:** Tratamiento de afecciones que cursan con inflamación y/o dolor de intensidad leve a moderada. Tratamiento sintomático del dolor de intensidad leve a moderada. Tratamiento sintomático de la dismenorrea primaria. Tratamiento sintomático de la migraña (con o sin aura) Tratamiento de la fiebre.

**Vía de Administración:** Oral.

**Posología:** Afecciones que cursan con inflamación y/o dolor de intensidad leve a moderada: Adultos: 75-150 mg/día vía oral divididos en 2 o 3 dosis iguales. Dolor de intensidad leve a moderada: Adultos: 12.5 mg vía oral cada 6 horas Dismenorrea primaria: Adultos: 75-150 mg/día vía oral divididos en 2 o 3 dosis iguales. Migraña: Adultos: Dosis única de 50 mg vía oral. Si al cabo de 2 horas no se logra una respuesta adecuada, se puede repetir la dosis. Dosis total máxima: 100 mg. Fiebre: Adultos: 12.5 mg vía oral cada 6 horas Dosis máxima diaria: Adultos: 200 mg/día

**Advertencias:** Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No se administre en el embarazo o cuando se sospeche su existencia, a menos que el médico lo indique. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspenda la lactancia materna mientras dure el tratamiento. Informe al médico si se presenta algún efecto indeseable con el uso de este producto, en especial trastornos del sistema digestivo.



Si se presentan síntomas de alergia, suspenda el uso e informe al médico. Este producto no debe administrarse a pacientes con intolerancia a la lactosa o galactosa. Antes de administrar este producto, lee el prospecto interno. No exceda la dosis prescrita. Manténgase este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugar fresco, seco, protegido de la luz y a temperatura inferior a 30° C.