



FAMOTIDINA 40 mg TABLETAS

Composición: Cada tableta contiene: Famotidina 40,00 mg, Lactosa 132,82 mg, Glicolato Sódico de Almidón 3,52 mg, Excipientes c.s.

Indicaciones: 1)Úlcera duodenal, úlcera gástrica. 2)Tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico con o sin úlcera esofágica asociada. 3) Síndrome de Zollinger Ellison

Vía de Administración: Oral.

Posología: (A criterio del médico tratante): 1) Dosis inicial: 40 mg al acostarse durante 4 a 8 semanas o 20 mg dos veces al día. Mantenimiento 20 mg / día. 2) 20 mg dos veces al día. 3) Dosis inicial: 20 mg cada 6 horas. El médico posteriormente ajustará la dosis en función de las necesidades de cada paciente.

Advertencias: Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspenda la lactancia materna mientras dure el tratamiento. Este producto no debe administrarse a pacientes con intolerancia a la lactosa o galactosa. El tratamiento con este producto no debe discontinuarse o modificarse sin orden médica. Antes de administrar este producto, lea el prospecto interno. No exceda la dosis prescrita. Manténgase este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugar fresco, seco, protegido de la luz y a temperatura inferior a 30° C.