



## FEBRILIX 120 mg/5 mL SOLUCIÓN ORAL

**Composición:** Cada 5 mL contiene: Acetaminofén 120,0 mg, Sacarina Sódica 7,5 mg, Agua Purificada c.s.

**Indicaciones:** Tratamiento sintomático de la fiebre y del dolor de leve intensidad.

**Vía de Administración:** Oral.

**Posología:** (Dosis recomendada): Dosis de 10 mg/kg/dosis, cada 4-6 horas.

Dosis máxima 15 mg/kg cada 6 horas Niños: Recién nacidos a 3 meses: 60 mg/dosis (2,5 mL) Mayores de 3 meses a 6 meses: 80 mg/dosis (3,3 mL) Mayores de 6 meses a 1 año: 100 mg/dosis (4,2 mL) Mayores de 1 año a 2 años: 120 mg / dosis (5 mL) Mayores de 2 años a 4 años: 160 mg/dosis (6,7 mL) Mayores de 4 años a 6 años: 200 mg/dosis (8,3 mL)

**Advertencias:** Si los síntomas persisten por más de dos días con el uso de este medicamento, suspéndase y consulte al médico. La administración de este producto en dosis mayores a las recomendadas o por tiempo prolongado (más de 48 horas) puede ocasionar graves lesiones hepáticas y renales. Debe evitar el uso simultáneo de este producto con otros productos que contengan PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN). En caso de insuficiencia hepática no se exceda de 2 g en un día y el intervalo de dosis será cada 8 horas. No exceda la dosis recomendada. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese protegido de la luz, a temperatura inferior a 30° C.