



### **FEBRILIX GRIP 500 mg-2 mg TABLETAS RECUBIERTAS.**

**Composición:** Cada tableta recubierta contiene: Acetaminofén 500 mg, Maleato de Dextroclorfeniramina 2,00 mg, Lactosa 16,48 mg, Almidón de Maíz 3,86 mg, Excipientes c.s.

**Indicaciones:** Tratamiento sintomático del resfriado común.

**Vía de Administración:** Oral.

**Posología:** (Adultos y Niños mayores de 12 años): Adultos: Una tableta cada 4 ó 6 horas. Dosis máxima: 3 g en 24 horas.

**Advertencias:** Si está embarazada o en período de lactancia, consulte a su médico antes de usar este producto. Si los síntomas persisten por más de dos días con el uso de este medicamento, suspéndase y consulte al médico. Por su contenido de Acetaminofén de este producto en dosis mayores a las recomendadas o por tiempo prolongado (más de 48 horas) puede ocasionar graves lesiones hepáticas y renales. Debe evitar el uso simultáneo de este producto con otros productos que contengan PARACETAMOL (ACETAMINOFÉN). En caso de insuficiencia hepática y/o alcoholismo crónico no se exceda de 2 g en un día y el intervalo de dosis será cada 8 horas. Este producto no debe administrarse en pacientes con intolerancia a la lactosa o galactosa. No exceda la dosis recomendada. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugar fresco, seco, protegido de la luz y a temperatura inferior a 30° C.