



## LORATADINA - AMBROXOL CLORHIDRATO 5 mg - 30 mg TABLETAS

**Composición:** Cada tableta contiene: Loratadina 5,00 mg, Clorhidrato de Ambroxol 30,00 mg, Almidón de Maíz 54,00 mg, Excipientes c.s.

**Indicaciones:** Tratamiento de las afecciones respiratorias asociadas a procesos alérgicos que cursan con dificultad para expulsar las secreciones bronquiales.

**Vía de Administración:** Oral.

**Posología:** (Dosis recomendada): Adultos y niños mayores de 12 años: 1 tableta cada 12 horas.

**Advertencias:** Si está embarazada o en período de lactancia, consulte al médico antes de usar este producto, si los síntomas persisten y no se observa mejoría después de 2 a 3 días con el uso de este medicamento, suspéndase y consulte al médico. Si presenta palpitaciones o agitación psicomotriz, suspéndase y consulte al médico. Este producto por contener Loratadina puede causar somnolencia durante su administración, evítense actividades que impliquen coordinación y estados de alerta mental. Este producto contiene piro sulfito de sodio, el mismo puede ocasionar reacciones alérgicas, incluyendo shock anafiláctico. La sensibilidad del sulfito se observa con mayor frecuencia en individuos asmáticos. No exceda la dosis recomendada. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese protegido de la luz, a temperatura inferior a 30° C.