



LORATADINA 1 mg/mL JARABE

Composición: Cada mL contiene:

Loratadina 1,00 mg, azúcar 600,00 mg, Alcohol Etilico (d=0,806) 0,5 g %, Metilparabeno 1,50 mg, Excipientes c.s.p. Cada cucharadita (5 mL) contiene 5 mg de Loratadina.

Indicaciones: Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica, urticaria y otras afecciones dermatológicas alérgicas, como dermatitis atópica.

Vía de Administración: Oral.

Posología: Niños de 2 años (peso > 20 kg) a 12 años: 5 mL (5 mg) una vez al día Niños de 2 años (peso < 20 kg): 2,5 mL (2,5 mg) una vez al día

Advertencias: No administrar a niños menores de 2 años. Si los síntomas persisten y no se observa mejoría después de 2-3 días con el uso de este medicamento, suspéndase y consulte al médico. Este producto puede causar somnolencia. Durante su administración evítense actividades que impliquen coordinación y estados de alerta mental. Este producto no debe administrarse en pacientes con intolerancia a la sacarosa. Manténgase fuera del alcance de los niños. No exceda la dosis recomendada. Consérvese en lugar fresco, a temperatura inferior a 30° C.