



METRONIDAZOL BENZOIL 125 mg / 5 mL SUSPENSIÓN ORAL

Composición: Cada 5 mL contienen: Metronidazol 125,00 mg (como Metronidazol-benzoil), Sacarina Sódica 5,00 mg, Sacarosa 3,00 g, Excipientes c.s.

Indicaciones: Tratamiento de infecciones parasitarias causadas por giardias, tricomonas y amebas. Tratamiento de infecciones causadas por gérmenes anaerobios sensibles al metronidazol.

Vía de Administración: Oral.

Posología: Giardiasis: Niños: 15 mg / kg / día, divididos en 3 dosis iguales (una cada 8 horas) por 5 - 7 días. Amebiasis: Niños: 35 - 50 mg / kg / día, divididos en 3 dosis iguales (una cada 8 horas). Para absceso hepático amebiano: la misma dosis. Infección por gérmenes anaerobios (a continuación de tratamiento inicial por vía IV): 7,5 mg / kg cada 8 horas.

Advertencias: Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No exceda la dosis prescrita ni interrumpa el tratamiento antes del tiempo previsto, aunque hayan desaparecido los síntomas de la infección. Este producto no debe administrarse en pacientes con intolerancia a la sacarosa. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese protegido de la luz, a temperatura inferior a 30° C. Agite antes de usar. Si no se homogeniza no se administre.