



METRONIDAZOL BENZOIL 250 mg / 5 mL SUSPENSIÓN ORAL

Composición: Cada 5 mL contienen: Metronidazol 250,00 mg (como Metronidazol-benzoil), Sacarina Sódica 5,00 mg, Sacarosa 3,00 g, Excipientes c.s.

Indicaciones: Tratamiento de infecciones parasitarias causadas por giardias, tricomonas y amebas. Tratamiento de infecciones causadas por gérmenes anaerobios sensibles al metronidazol.

Vía de Administración: Oral.

Posología: Giardiasis: Adultos: 250 mg 3 veces al día (cada 8 horas) Tricomoniasis: Adultos: Dosis única de 2 g como dosis simple o dividida en 2 tomas (cada 12 horas) en 24 horas. Alternativamente: 250 mg tres veces al día (cada 8 horas) por 7 días. Amebiasis: Adultos: 750 mg tres veces al día (cada 8 horas). Para absceso hepático amebiano: 500 o 750 mg tres veces al día (cada 8 horas) Infección por gérmenes anaerobios (a continuación de tratamiento inicial por vía IV): Adultos: 7,5 mg / kg cada 6 horas (máximo 4 g / día)

Advertencias: Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, a menos que el médico lo indique. En caso de ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica, suspéndase la lactancia mientras dure el tratamiento.



Evite el consumo de bebidas alcohólicas durante el tratamiento y hasta 3 días después de finalizado. No exceda la dosis prescrita ni interrumpa el tratamiento antes del tiempo previsto, aunque hayan desaparecido los síntomas de la infección. Este producto no debe administrarse en pacientes con intolerancia a la sacarosa. Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese protegido de la luz, a temperatura inferior a 30 °C. Agite antes de usar. Si no se homogeniza no se administre