



### **SILDENAFIL 50 mg TABLETAS RECUBIERTAS**

**Composición:** Cada tableta recubierta contiene: Sildenafil (como Sildenafil Citrato) 50 mg, Excipientes c.s.

**Indicaciones:** 1.-Tratamiento de la disfunción eréctil de cualquier etiología.  
2.-Tratamiento de pacientes con hipertensión arterial pulmonar de diferentes etiologías.

**Vía de Administración:** Oral.

**Posología:** 1.-Adultos: 50 mg/día, aproximadamente 1 hora antes de la actividad sexual. Basado en la efectividad y tolerancia, la dosificación puede aumentarse a 100 mg o disminuirla a 25 mg. La máxima frecuencia de dosificación recomendada es una vez al día. 2.-Adultos: 20 mg vía oral cada 8 horas

**Advertencias:** Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilancia médica. Si se produce disminución o pérdida repentina de la visión con el uso de este producto, suspéndalo y consulte al médico. Antes de administrar este producto, leer el prospecto interno. No exceda la dosis prescrita. Manténgase este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Consérvese en lugar fresco, seco, protegido de la luz y a temperatura inferior a 30° C.